

# Behandling af vorter med diphenylcyklopropenon (DCP)

## Patientvejledning

Behandling af vorter med Diphenylcyklopropenon (DCP) er meget langvarig. Derfor bliver kun meget besværlige vorter behandles på denne måde. Med én behandling hver 2.-3. uge vil 50% være raske efter 5 måneder og 90% efter 10 måneders behandling.

### Hvad går behandlingen ud på?

Med DCP fremkaldes en eksemreaktion på vortestederne og denne eksemreaktion holdes så vidt muligt vedlige ved behandlingen hver 2.-3. uge. Den fremkaldte eksemreaktion skyldes, at der kommer en ansamling af immunaktive celler i huden. Både selve stoffet DCP og de immunaktive celler er formentlig med til at ødelægge det vortevirus, som er skyld i vorterne. Den nøjagtige virkningsmekanisme kendes dog ikke. Resultatet er imidlertid, at vorterne forsvinder efter kortere eller længere tids behandling.

### Bivirkninger

Behandlingen giver imidlertid generende kløe hos hver 5., som behandles. Behandlingen tilpasses derfor den enkelte ved at bruge forskellige styrker af behandlingsmidler, hvorved der opnås så god virkning som muligt og så få gener som muligt. I tilfælde af kløe eller udslæt under behandlingen, behandles denne med eksemcreme.

### Gravide og ammende

Disse bør ikke behandles. For at sikre et foster så gode vækstbetingelser som muligt, bør gravide kun undtagelsesvis behandles med medicin under svangerskabet. Vortebehandling med DCP bør derfor vente til efter fødsel og ammeperiode er overstået.

Undertegnede erklærer at have læst og forstået ovenstående patientinformation og er indforstået med indholdet heri.

---

Dato

Underskrift & CPR-nummer