

Behandling med bucky stråler

Patientvejledning

Hvad er bucky-stråler?

Bucky-stråler kaldes også "grænsestråler" eller "bløde røntgenstråler". Bucky anvendes til behandling af psoriasis, eksem eller andre hudsygdomme, oftest som supplement til anden behandling. Behandlingen virker kløestillende og hæmmende på inflammatoriske tilstande. Effekten af behandlingen indtræder sædvanligvis først efter behandlingsserien er endt.

Om behandlingen

Bucky gives efter lægeordination i en serie på 3-5 behandlinger med syv dages interval. Behandlingen tager, for hvert område, der skal behandles fra få sekunder til et minut. Beregn ca. 10 minutter pr. besøg. Op til fire områder målende 12 cm i diameter kan behandles pr. behandlingsserie. Behandling af samme hudområde kan gentages efter fire måneder.

Bivirkninger

Behandlingen kan give en midlertidig rødme, som kan efterfølges af en længerevarende pigmentering af det behandlede område. På grund af en lille øget risiko for en ret fredelig form for overfladisk hudkræft i det behandlede hudområde må hvert område, der behandles højst modtage en kumuleret stråledosis svarende til 25-50 behandlinger livslangt (100 Gy).

Undertegnede erklærer at have læst og forstået ovenstående patientinformation og er indforstået med indholdet heri.

Dato

Underskrift & CPR-nummer