

Hudlægen informerer om

Hydroxyklorokin/klorokin

I pjecen informeres om behandling med hydroxyklorokin/klorokin. Hvis der er spørgsmål, som ikke er besvaret, bør de stilles til hudlægen.

Hydroxyklorokin/klorokin anvendes sædvanligvis til forebyggelse af malaria. Stofferne har også en hæmmende virkning på betændelsesreaktioner ved bindevævssygdomme og lysudslæt. Virkningen indtræder som regel efter ugers til måneders behandling.

Hvordan tages hydroxyklorokin/klorokin?

Stofferne tages som tabletter 1 evt. 2 gange dagligt.

Bivirkninger

De fleste har ingen bivirkninger af hydroxyklorokin/klorokin. Enkelte får kvalme, opkastning, diaré, hovedpine, hørenedsættelse eller hududslæt. Disse gener svinder ved ophør af medicinen.

Efter lang tids behandling kan hydroxyklorokin/klorokin i meget sjældne tilfælde påvirke øjets nethinde med nedsat syn til følge. Regelmæssig øjenlægekontrol kan forebygge denne bivirkning. Endvidere kan de røde og hvide blodlegemer samt blodpladerne påvirkes i sjældne tilfælde.

Hydroxyklorokin/klorokin kan forværre psoriasis og bør normalt undgås ved denne sygdom.

Prævention, graviditet og amning

Hydroxyklorokin/klorokin bør ikke anvendes under graviditet og amning. Der bør benyttes prævention under behandlingen.

Kontrol

Øjenlægekontrol aftales med hudlægen. Sygdomsaktivitet og tegn på evt. bivirkninger kontrolleres ved hjælp af blodprøver.

